

Objavljeno na: www.dentopedia.info

Izbeljivanje zuba I



Sve češći razlog zbog koga se pacijenti obraćaju stomatologu jeste prebojenost zuba. Bilo da se radi o prebojenosti jednog ili svih zuba ovakve situacije predstavljaju ne samo zdravstveni već najčešće i estetski problem. Samo korigovanje boje spada u najpopularnije procedure u stomatologiji i može značajno da poboljša izgled pacijenta. Zato je sve je više ljudi koji se odlučuju za postupak izbeljivanja zuba.



Promena boje zuba prirodno se javlja sa starenjem. Može biti izazvana i čestom konzumacijom duvana, kafe, čajeva, ili upotrebom različiti medikamenti koji se koriste u stomatologiji ili u lečenju drugih oboljenja. Preparati gvožđa, kao i upotreba antibiotika iz grupe tetraciklina takođe pod određenim uslovima mogu da dovedu do prebojenosti zuba.

Postoje dve faze u korigovanju boje zuba. Prva podrazumeva uklanjanje pigmentacija, čvrstih i mekih naslaga sa zuba, ultrazvučnim aparatom i aparatima za vazdušnu abraziju koji su veoma efikasni za manje korekcije boje zuba, lokalizovane diskoloracije, ružne duvanske ili alimentarne pigmentacije i sl. Ukoliko ni tada efekti nisu zadovoljavajući prelazi se na sledeću fazu izbeljivanja zuba. Druga faza u korigovanju boje zuba podrazumeva upotrebu hemijskih sredstava i aparata za izbeljivanje. Od hemijskih supstanci najčešće se preparati na bazi karbamid peroksida, vodonik peroksida itd. Važno je da ovi preparati budu adekvatno skladišteni, adekvatno transportovani i aplikovani, kako bi njihov efekat bio maksimalan.



U zavisnosti od metode izbeljivanja tokom tretmana ili nakon njega mogu nastati manje ili veće neprijatnosti u vidu osetljivosti i crvenila desni, umerene bolne osetljivosti najčešće na hladno i sl. Ovakve prolazne neprijatnosti javljaju se kod 50% pacijenata, ali su privremene i ne oštećuju trajno zube.